


La circuncisión es la cirugía que consiste en retirar la piel que cubre la punta del pene o prepucio, cuando está muy estrecho y no retrae, consiste en realizar una incisión o cortada a nivel de la piel que cubre la cabeza del pene en forma circular y extraer el tejido sobrante, dejándola completamente descubierta, posteriormente la herida de sutura con puntos en toda su extensión, se recubre el pene con un ungüento y se envuelve de manera holgada con gasa.

Al terminar la cirugía el paciente es llevado a recuperación de cirugía y posteriormente se le da de alta con indicaciones de curación en la herida quirúrgica, medicamentos para el dolor, incapacidad (si la requiere) y cita de revisión de 7 a 10 días posteriores al procedimiento por consulta externa.



PREPARACIÓN:

- Preséntese al servicio de cirugía con acompañante
- No coma, ni beba nada 8 horas antes de la cirugía
- Si usa, elementos personales como lentes, prótesis, entre otros, haga entrega al acompañante.
- Evite traer a la clínica objetos de valor.
- Presente al ingreso a cirugía los exámenes y documentos que le hayan solicitado.

RECOMENDACIONES CUIDADOS EN CASA:

- NO tiene restricciones para la alimentación.
- Come mucha fibra y bebe mucho líquido.
- Inicie el tratamiento ordenado lo antes posible, con la frecuencia y cantidad ordenadas, no los suspenda así se sienta bien.
- Levantarse y caminar en las siguientes 24 horas después de la cirugía es más beneficioso que permanecer en cama, al levantarse, hacerlo lentamente y acompañado.

- Usa ropa interior y prendas de vestir sueltas.
- Tenga especial cuidado con los niños de que no se toque el pene.
- No tener relaciones sexuales hasta que la herida esté completamente curada.

CUIDADOS DE LA HERIDA:

- Lave bien las manos antes de manipular el sitio de la cirugía.
- Al día siguiente de la cirugía retire la curación de la herida quirúrgica y lave con abundante agua y jabón de baño exclusivo para la herida (esto es fundamental para evitar la infección de la herida), luego seque bien la herida y cúbrala con una gasa. El mismo procedimiento se debe realizar hasta que tenga la cita de revisión.
- Siga las indicaciones sobre la cita para revisión de la herida y retiro de puntos de sutura.

SIGNOS DE ALARMA POR LOS CUALES CONSULTAR POR URGENCIAS:

- Signos de infección en la herida: calor, rubor, secreción verdosa.
- Fiebre mayor de 38°C.
- Dolor que no cede al analgésico
- Sangrado excesivo.
- Si se “sueltan o revientan” los puntos
- Si la herida se abre (dehiscencia de herida quirúrgica).
- Si presenta hinchazón severa del pene.