

**Usuario:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

- Permanecer acostado sobre el sitio de punción durante las primeras 4 horas.
- El paciente debe permanecer en reposo relativo (No realizar esfuerzos), durante las siguientes 12 horas después de la toma de la biopsia.
- El dolor se maneja con analgésicos comunes (acetaminofén) y abstenerse de tomar medicamentos anticoagulantes (Aspirina) los primeros tres días después de la biopsia.
- Retirar cura o apósito del sitio de punción al día siguiente.

**Debe consultar al servicio de urgencias que su entidad de salud le tiene asignado,**

**Si presenta:**



- Dolor abdominal
- Distensión abdominal (aumento del abdomen).
- Sudoración excesiva, palidez, temblor
- Enrojecimiento, calor o salida de líquido de color amarillo o pus por el sitio de punción
- Sangrado por el sitio de punción.

**Recomendación:**

- Reclamar resultado de la patología 8 días hábiles posteriores al procedimiento, debe comunicarse con el laboratorio de Patología Integral al teléfono 3269266.
- Solicitar cita para revisión de estudio a médico tratante una vez tenga resultado de anatomía patológica.

**Recuerde llenar la encuesta entregada en la recepción luego de su examen, sus sugerencias son importantes para mejorar nuestro servicio**