CUIDADOS DÍA DEL PROCEDIMIENTO:

- Profilaxis antibiótica: Aplicar 1 hora antes del procedimiento Cefazolina 2gr Intravenoso, en caso de que el paciente sea alérgico aplicar Ciprofloxacino 400 mg Intravenoso. Este medicamento deberá ser ordenado por el médico tratante o el médico de piso.
- Vigilar las primeras 4 horas después de la sedación, que esta alerta, responda al llamado y respire sin dificultad.
- Reposo relativo durante dos horas después de la endoscopia (solo ir al baño acompañado).
- Pasar por la sonda de gastrostomía a las dos horas dextrosa al 5% por 4 horas y luego evaluar por nutricionista o iniciar dieta sugerida de 6 a 12 horas después del procedimiento.

Debe consultar al servicio de urgencias que su entidad de salud le tiene asignado, **si presenta:**

- Dolor, distensión abdominal, vómito, sangrado, rubor, calor, hematoma, empastamiento, salida de alimento por el sitio de inserción de la sonda o temperatura mayor a 38°c.

CUIDADOS POSTERIORES AL PROCEDIMIENTO (CUIDADOS EN CASA)

- En el momento de administrar la alimentación el paciente debe de estar semisentado y permanecer así por 1 hora (esto evitara que el alimento se vaya a los pulmones).
- Lavar la sonda con 30 cc de agua tibia con jeringa de 50 cc punta catéter antes y después de administrar el alimento o el medicamento.
- Durante el baño del paciente lavar sonda por fuera con agua y jabón y secar muy bien la sonda y piel circundante (puede ser con secador a muy baja temperatura *fría) y lubricar piel con crema humectante.

VIGILADO Supersalud

Recuerde llenar la encuesta entregada en la recepción luego de su examen, sus sugerencias son importantes para mejorar nuestro servicio.