

Usuario: _____

Fecha: _____

- Durante las primeras 4 horas después de la sedación, se debe vigilar que el paciente esté alerta, responda al llamado, respire sin dificultad y no debe presentar sangrado por boca.
- Reposo relativo durante dos horas después de la endoscopia, solo puede ir al baño, pero acompañado.
- Durante las primeras cuatro (4) horas después de la endoscopia, abstenerse de realizar actividades que requieran concentración como: conducir, manejar maquinaria peligrosa, trabajo con material corto punzante, entre otras.
- Cuando esté **completamente despierto**, iniciar alimentación con dieta **líquida fría durante 3 a 4 días o según indicación médica, luego dieta blanda por 3 días y luego alimentación normal o según orden médica.**
- Durante la primera semana, si toma medicamentos estos deben ser triturados antes de tomarlos.

Debe consultar al servicio de Urgencias, si presenta:

- Sangrado por cualquier vía, dolor en el pecho de intensidad importante que no mejora con los medicamentos indicados o que se prolongue por más de **3 días** después del procedimiento.

Recomendación:

- En caso de que le realicen biopsia, reclamar resultado de la patología 8 días hábiles posteriores al procedimiento, debe comunicarse con el laboratorio de Patología Integral al teléfono 3269266.
- Solicitar cita para revisión con el médico tratante una vez tenga resultado de la patología, debe llevar el resultado del estudio y de otros anteriores.

Recuerde llenar la encuesta entregada en la recepción luego de su examen, sus sugerencias son importantes para mejorar nuestro servicio.