Usuario: _____

Fecha: _____

- Tomar abundantes líquidos (2 Litros) Las primeras 24 horas si no tiene restricciones.
- Continuar con la dieta acostumbrada preferiblemente baja en grasas.
- Retirar algodón o cura del sitio de punción al llegar a su casa o sitio de trabajo.
- Continuar con los medicamentos que acostumbra a tomar. (Si es **Glucophage o Metformina**, consultarlo con su médico tratante).

Debe consultar al servicio de urgencias que su entidad de salud le tiene asignado si presenta:

- Prurito o enrojecimiento en la piel, dificultad respiratoria, vómito, mareo, cefalea o algún otro síntoma extraño por la aplicación de contraste.
- Si aparecen signos de infección como: edema, área enrojecida y caliente, dolor intenso o salida de líquido por el sitio de la venopunción.

Recomendación:

- Si requiere tratamiento tiroideo con radioisótopos debe esperar por 2 meses posteriores a la administración de medio de contraste yodado.
- Si requiere realizarse otro estudio contrastado como resonancia magnética debe esperar mínimo 24 horas y realizar creatinina de control, si es tomografía debe esperar mínimo 48 horas y realizar creatinina de control.
- Si requiere estudios de laboratorio en sangre u orina 24 horas posterior a administración de medio de contraste debe informar al laboratorio que le administraron contraste.

Recuerde llenar la encuesta entregada en la recepción luego de su examen, sus sugerencias son importantes para mejorar nuestro servicio.