

**Usuario:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_

La **toracocentesis** es un procedimiento para extraer líquido en el espacio entre los pulmones y la pared torácica, llamado espacio pleural. Se realiza con una aguja (y a veces con un catéter de plástico) que se inserta a través de la pared torácica, se utilizan imágenes de una ecografía para guiar la colocación de la aguja. Este líquido pleural puede ser enviado al laboratorio para determinar qué puede estar causando la acumulación de líquido en el espacio pleural.

- Después del procedimiento, una vez descartado no se haya presentado un neumotórax (aire en el pulmón), y si el paciente se encuentra en buenas condiciones, se envía a casa.
- Puede presentar tos con expectoración con sangre.
- Retirar cura o apósito del sitio de punción al día siguiente.

**Debe consultar al servicio de urgencias que su entidad de salud le tiene asignado, si presenta:**

- Dificultad respiratoria.
- Sudoración excesiva, palidez o temblor.
- Calor, rubor (enrojecimiento), sangrado, hematoma, en el sitio de la punción.
- Fiebre (mayor de 38°C) en las 48 horas siguientes a la punción.
- Salida abundante de líquido claro, sangre o pus por el sitio de la punción

**Recomendación:**

- Retirar cura o apósito del sitio de punción al día siguiente.
- Reclamar resultado de laboratorio (cuando aplica).
- En caso de tomar muestra de patología, reclamarla 8 días hábiles después de realizado el procedimiento, en el laboratorio de patología teléfono 3269266.
- Solicitar cita para revisión de estudio a médico tratante una vez tenga resultados de laboratorio y patología.

**Recuerde llenar la encuesta entregada en la recepción luego de su examen, sus sugerencias son importantes para mejorar nuestro servicio.**