



1. Lave bien sus manos con agua y jabón y séquelas con una toalla

2. Verifique la fecha de vencimiento del medicamento.

3. Tome la jeringa pre llena de anticoagulante



4. Desinfecte el sitio de aplicación del medicamento con algodón impregnado con alcohol, haciendo movimientos en espiral.



5. Recuerde los sitios de aplicación subcutánea de acuerdo con la imagen



6. Tome el pliegue cutáneo (desinfectado previamente) entre el pulgar y el índice, e introduzca la aguja verticalmente en todo su largo, sobre el espesor de pliegue cutáneo.



7. Mantenga el pliegue cutáneo durante toda la aplicación y espere 10 segundos antes de retirar la aguja.

8. No frote el sitio de la inyección al terminar.

9. No debe eliminarse la burbuja de la jeringa prellenada, con el fin de evitar la pérdida del medicamento, este viene listo para ser usado.



10. Retirar la jeringa, colocar de nuevo la tapa protectora y desechar la jeringa.

**Recuerde NO HACER PRESIÓN NI REALIZAR MASAJES en la zona de inyección.**

### ¿Cómo debe Almacenar el Medicamento?

Consérvese a temperatura ambiente. Protegido de la luz. No almacenar medicamentos en lugares donde tenga mucha humedad como el baño o donde se conservan las temperaturas.

### ¿Cómo Desechar las Jeringas Utilizadas?

Descartar las jeringas en un recipiente rígido y con tapa (botellas de plástico, latas con tapa), marcar con la siguiente frase: **RIESGO BIOLÓGICO**.

### Recomendaciones Generales

- Evite darse golpes y tenga cuidado en manipular objetos cortopunzantes con el fin de evitar heridas y cortadas.
- Haga el cepillado de sus dientes con cepillo de cerdas suave y con cuidado.
- Siempre verifique la fecha de vencimiento del medicamento. Si observa alguna partícula dentro de la jeringa **NO ADMINISTRE EL MEDICAMENTO**

### ¿Cuándo Consultar al Médico?

El tratamiento con heparinas de bajo peso molecular es muy importante para su salud, pero este puede causar problemas serios de hemorragia, es por eso que debe consultar a su médico cuando presente:

- Dolor, inflamación o malestar
- Dolor de cabeza intenso, mareo o cansancio
- Moretones o Hematomas inusuales (que aparecen o aumentan de tamaño sin causa conocida)
- Hemorragia nasal
- Hemorragia en encías
- Hemorragia causada por corte, que toma mucho tiempo en detenerse.
- Hemorragia menstrual más abundante de lo normal
- Orina que cambia de color a rojo, café o rosada
- Deposiciones rojas o negras
- Expectoración con sangre y aspecto de café molido
- Vómito con sangre
- Dificultad al hablar, desvanecimientos, trastornos de la visión, desviación de los labios o pérdida del conocimiento.
- Si presenta dificultad para respirar, brote, hinchazón en los labios, lengua, es porque puede estar presentando una reacción alérgica al medicamento.

**RECUERDE QUE SI PRESENTA SANGRADO ABUNDANTE DEBE VISITAR EL SERVICIO DE URGENCIAS**

Si presenta alguna inquietud acerca de su tratamiento anticoagulante, con gusto será atendida por favor comuníquese con los Servicios Farmacéuticos de la Clínica El Rosario: [farmacovigilanciat@clinicaelrosario.com](mailto:farmacovigilanciat@clinicaelrosario.com) Y a los teléfonos: *Sede Centro (4) 2959000 Ext.9157 / Sede Tesoro (4) 3269100 Ext. 5124*

**AMOR QUE ACOMPAÑA SERVICIO QUE ALIVIA.**