



¿QUÉ SON LOS ANALGÉSICOS Y PARA QUÉ SE UTILIZAN?

Son medicamentos utilizados para controlar, calmar y aliviar el dolor, causado por una enfermedad, trauma, cirugía y/o procedimiento entre otros.

El médico es quien define el tipo de antihipertensivo que usted requiere, la dosis, la frecuencia y el tiempo de duración del tratamiento.

Se aconseja informar al médico que otros medicamentos toma y las enfermedades que sufre para que el médico verifique si el analgésico que va a formular está contraindicado.



¿CÓMO TOMAR EL MEDICAMENTO ANALGÉSICO?

Es muy importante seguir las indicaciones escritas en la fórmula médica (nombre del medicamento, dosis, vía y hora).

Se aconseja que los analgésicos se tomen juntos a las comidas o con un gran vaso de agua, para evitar molestias estomacales. No debe tomarse con alcohol.



RECOMENDACIONES

Aún si no se siente bien, NO modifique el tratamiento ordenado, consulte al médico.

- No se automedique (tome medicamentos solamente ordenados por un médico).
- Nunca suspenda su tratamiento, aunque se esté sintiendo muy bien.
- No exceda la dosis recomendada por el médico.
- Si cree estar presentando un efecto no deseado relacionado con el medicamento, (son poco frecuentes), informe al médico tratante.
- Si el dolor persiste o incluso aumenta, aún después de una hora de haber tomado un analgésico, consulte su médico.
- Si el dolor se localiza en el abdomen, se ha presentado súbitamente y es intenso consulte su médico.
- Notifique siempre a su médico el total de medicamentos que toma.
- Cada persona reacciona de manera diferente a cada analgésico, por eso es necesario seguir las instrucciones del médico.

- Si padece una enfermedad renal, cardiovascular, o está en tratamiento con anticoagulantes, infórmele al médico antes que le formule los medicamentos analgésicos, para evitar riesgos.
- No todos los analgésicos son iguales, ni sirven para lo mismo, cada uno tiene sus propias funciones, ventajas y riesgos por lo cual es indispensable no auto medicarse (no tomar medicamentos que no son ordenados por el médico).
- Si está embarazada y presenta un dolor consulte al médico.



EFFECTOS ADVERSOS MÁS COMUNES

- Se pueden producir diferentes efectos entre los más comunes: Náuseas, vómito, mareo, fatiga, visión borrosa, malestar gástrico, reacciones alérgicas, estreñimiento, somnolencia, sequedad bucal.
- Debe utilizarse con precaución en asmáticos, alérgicos, hipertensos, con problemas gástricos y en personas con problemas de hígado o riñón.
- El acetaminofén puede ser usado en embarazadas, madres lactantes y bebés.



¿CUÁNDO CONSULTAR?

Consulte de inmediato en caso de presentar:

- Alergia al medicamento (presencia de ronchas en la piel, picazón o inflamación)
- Intolerancia al medicamento (náuseas, vómito).
- Cuando el dolor no se mejore con el analgésico ordenado.
- Cuando el dolor aumente a pesar del consumo de los medicamentos.
- Cuando presente un dolor localizado en una parte diferente al que tenía inicialmente.

Cualquier inquietud acerca de su tratamiento, con gusto será atendida por el Químico Farmacéutico en el Teléfono: (604) 295 90 00 Ext.9157 Sede Centro y Ext.5124 Sede Tesoro.