

RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO:

- Diríjase a la IPS tuberculosis de su aseguradora para ingresar al programa (en caso de que no lo hayan contactado en los primeros 3 días posteriores al alta)
- Tome el medicamento para tuberculosis con agua en ayunas, luego de dos horas podrá consumir los alimentos, excepto grasa o lácteos para los cuales debe esperar 4 horas.
- Si el médico le ordeno omeprazol, tómelo en horario opuesto al medicamento de tuberculosis (12Horas); Ejemplo, si se toma el tratamiento de tuberculosis en la mañana, el omeprazol se lo toma en la noche
- Evita el consumo de alcohol durante el tratamiento.
- No abandone el tratamiento así se sienta muy bien.
- Asiste puntualmente a los controles.

ES NORMAL QUE DURANTE EL TRATAMIENTO PRESENTE:

- Sensación de acidez en el estómago.
- Orina color naranja con olor a medicamento
- Deposiciones de color muy claro

CONSULTAR AL SERVICIO DE URGENCIAS EN CASO DE:

- Dolor abdominal intenso
- Coloración amarilla sus ojos
- Vómito persistente
- Aparición de brote en la piel
- Sensación de asfixia o ahogo

RECOMENDACIONES EN CASO DE TUBERCULOSIS PULMONAR:

- Al toser o estornudar cubrirse nariz y boca utilizando un pañuelo o papel desechable
- Utilizar el tapabocas permanentemente incluyendo en su hogar, hasta que su médico del programa le indique
- Las personas que convivan con el paciente deben usar tapabocas permanentemente hasta que el médico lo indique
- Mantener ventilado su hogar (Ventanas abiertas)

¡La seguridad es un compromiso de todos!